



H.B. Fuller



# Foster® First Defense 40-97 EU

## Anwendungshinweise

1. Größere Verunreinigungen von der Oberfläche entfernen.
2. Je nach Anwendung verdünnen (siehe Rückseite). Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bildung von Aerosolen vermeiden. Verwenden sie geeignete Schutzausrüstung (Hand- und Augenschutz, Schutzbekleidung und -schuhe). Lösung unmittelbar vor der Verwendung frisch zubereiten und auswechseln, wenn sie sichtbar verschmutzt oder verdünnt ist.
3. Auf der Oberfläche anwenden, durch Wischen, Betätigung des Sprühapplikators (mit oder ohne Wischen), Aufbringen & Wischen, Einweichen oder Einschäumen mit niedrigem Druck. Bei der Anwendung des verdünnten Produkts gute Arbeitshygienepraxis einhalten, wenn nötig, Handschuhe, Schutzanzug und/oder Schuhwerk tragen. 30-50 ml/m<sup>2</sup> aufbringen, damit die Fläche vollständig nass wird, und je nach Anforderung 5-60 Minuten einwirken lassen (siehe Rückseite). Die Oberfläche muss während der gesamten Kontaktzeit nass sein.
4. Spülen oder an der Luft trocknen lassen. Desinfizierte Oberflächen, die mit Nahrungsmitteln in Kontakt kommen können, müssen mit Trinkwasser abgespült werden. Fußböden müssen nur dann abgespült werden, wenn sie gewachst oder poliert werden sollen.
5. Das Produkt darf nicht in Kombination mit anderen Bioziden oder Reinigungsmitteln verwendet werden.
6. Verträglichkeit mit der Oberfläche zunächst an verdeckter Stelle prüfen.

### Erste Hilfe:

**Einatmen:** An die frische Luft bringen. Bei unregelmäßiger Atmung oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten. Sauerstoff geben. Ersthelfer muss sich selbst schützen. Sofort Arzt hinzuziehen.

**Hautkontakt:** Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Seife und Wasser abwaschen. Sofort Arzt hinzuziehen.

**Augenkontakt:** Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Sofort Arzt hinzuziehen.

**Verschlucken:** Sofort Arzt hinzuziehen. Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Erbrechen nicht ohne ärztliche Anweisung herbeiführen. Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen.

**Aufbewahrung und Haltbarkeit:** Behälter fest verschlossen halten. Um die Qualität des Produkts zu erhalten, nicht bei Hitze oder direkter Sonneneinstrahlung aufbewahren. An einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren.

### Entsorgung:

**Produkt:** Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen. Sich mit dem Entsorger in Verbindung setzen.

**Kontaminierte Verpackung:** Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen.

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Produktinformation und Etikett lesen.**



H.B. Fuller



# Foster® First Defense 40-97 EU

## Verdünnung und Kontaktzeiten

Organismus	Verdünnung (ml/l) / Kontaktzeit (min)	
	Gesundheitswesen	Industrielle und institutionelle Anwendung
Bakterien	70 / 5 oder 10 / 60	25 / 5
Hefe	2,5 / 5 oder 1,25 / 60	20 / 15
Sporen	50 / 60 (vor der Anwendung Oberfläche reinigen)	50 / 60 (vor der Anwendung Oberfläche reinigen)
Viren	60 / 60	20 / 15 (nur umhüllt & Norovirus)
Pilze	60 / 60	40 / 15

30-50 ml/m<sup>2</sup> auf die Oberfläche aufbringen.  
Anwendungshäufigkeit: 1-2 Mal pro Tag bzw. entsprechend den geltenden Hygienevorschriften.  
Die Oberfläche muss während der gesamten Kontaktzeit nass sein.



**H.B. Fuller**



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website  
[www.fosterproducts.com/EU-Disinfectant](http://www.fosterproducts.com/EU-Disinfectant)

